

## 13 Botanisch hooiland

### Introductie

Botanische graslanden zijn belangrijk vanwege hun botanische waarde, en daarnaast zijn ze ook voor de fauna belangrijk. Botanisch grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.



### Toe te passen gebieden / locaties

- Voor Waterschap Brabantse Delta: [klik hier](#)
- Voor Waterschap Rivierenland: [klik hier](#)
- Voor Waterschap De Dommel: [klik hier](#)
- Voor waterschap Aa en Maas: [klik hier](#)

### Beheereisen

- Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op min 90 % van de oppervlakte .
- Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
- Minimaal 8 verschillende indicatorsoorten uit lijst BIJ12 zijn gedurende het gehele jaar verspreid op de beheereenheid aanwezig

### Aanvullende beheervoorschriften

- Beweiding is toegestaan van 1 augustus tot 1 maart. Bijvoeren van weidend vee is niet toegestaan.
- De beheereenheid wordt in principe niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht. In overleg met het collectief kan een onderhoudsbemesting met ruige mest of bekalking worden gegeven (ongeveer één keer in de 5 jaar, afhankelijk van de situatie ter plekke).
- Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Doorzaai is, na overleg en goedkeuring van het collectief, toegestaan om de kruidenrijkdom te vergroten.
- Klepelen is niet toegestaan, m.u.v. haarden van probleemonkruiden.
- Maaien na 15 juni tenzij collectief met deelnemer andere maaidatum heeft afgesproken. Het maaisel moet binnen 14 dagen afgevoerd worden.
- Bij de 1<sup>e</sup> maaibeurt worden langs de buitenkant van het perceel 4 meter brede stroken niet gemaaid.
- Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel of de rand) chemisch worden bestreden, dit geldt voor haarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Brandnetel en Jacobskruid.

## Beheerpakketten en beheervergoedingen

| 13. Botanisch waardevol grasland |                                                      | Vergoeding per hectare per jaar |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 13h                              | Botanisch hooiland extra divers (8 indicatorsoorten) | € 1.912,-                       |

Lijst van de meest voorkomende inheemse indicatorsoorten (de volledige lijst is in de zien op de website)

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Duizendblad                                        | Gewone Margriet (niet gecultiveerd*)                   |
| Madeliefje                                         | Rolklaversoorten                                       |
| Pinksterbloem                                      | Echte koekoeksbloem                                    |
| Knoopkruid                                         | Smalle weegbree (niet gecultiveerd*)                   |
| Kale Jonker                                        | Brunel                                                 |
| Walstrosoorten                                     | Zuringsoorten m.u.v. ridderzuring (niet gecultiveerd*) |
| Hertshooisoorten (St. janskruid, Kantig Hertshooi) | Grasmuur                                               |
| Gewoon biggenkruid                                 | Paardenbloem                                           |
| Zandblauwtje                                       | Klaversoorten (niet gecultiveerd*)                     |
| Leeuwentandsoorten (Herfstleeuwentand)             |                                                        |

*\*In dit type kruidenrijk grasland moeten inheemse soorten staan. Gecultiveerde soorten in mengsels voor productief kruidenrijk grasland (bv Pure Graze Mengsels) worden niet aangemerkt als indicatorsoorten.*